

รายงานข้อมูลด้านบริหารเวชภัณฑ์

สวัสดิ์ นายเสถียร สายชล ข้อมูลส่วนบุคคล ออกจาก ระบบ

หน้าหลัก ระบบโปรแกรม ข้อมูลพื้นฐาน ผู้มีอ

รายงานบริหารเวชภัณฑ์รายไตรมาส (กลุ่มงานเภสัชกรรม)
ยินดีต้อนรับ รพ.แม่ลาน

• เมนูหลัก

🏠 กลุ่มงานเภสัชกรรมรับผิดชอบ

ปีงบประมาณ 2566 ▾



ปีงบประมาณ 2566

จำนวนรายการ

ไตรมาส	ED	NED	เวชภัณฑ์มีใช้ยา
• ไตรมาสที่ 1	423	29	0
• ไตรมาสที่ 2	0	0	0
• ไตรมาสที่ 3	0	0	0
• ไตรมาสที่ 4	0	0	0

มูลค่าการจัดซื้อจัดหา

รวมเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

ไตรมาส	ED	NED	เวชภัณฑ์มีใช้ยา
• ไตรมาสที่ 1 (ต.ค 2565 - ธ.ค 2565)			
จัดซื้อรวม	538,129.96	10,960.00	0.00
ต่อรองราคารวม	538,129.96	10,960.00	0.00
สอบราคา/e-bidding	0.00	0.00	0.00
จัดซื้อเอง	648,266.50	50,135.80	0.00
ยาที่องค์การเภสัชกรรมผลิต	220,227.80	18,832.00	0.00
ยาจากผู้ผลิตรายอื่น	428,038.70	31,303.80	0.00
รับการสนับสนุน	268,273.69	16,478.00	0.00
• ไตรมาสที่ 2 (ม.ค 2566 - มี.ค 2566)			
จัดซื้อรวม	0.00	0.00	0.00
ต่อรองราคารวม	0.00	0.00	0.00
สอบราคา/e-bidding	0.00	0.00	0.00
จัดซื้อเอง	0.00	0.00	0.00
ยาที่องค์การเภสัชกรรมผลิต	0.00	0.00	0.00
ยาจากผู้ผลิตรายอื่น	0.00	0.00	0.00
รับการสนับสนุน	0.00	0.00	0.00
• ไตรมาสที่ 3 (เม.ย 2566 - มิ.ย 2566)			
จัดซื้อรวม	0.00	0.00	0.00
ต่อรองราคารวม	0.00	0.00	0.00
สอบราคา/e-bidding	0.00	0.00	0.00

ผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน RDU 2566

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	หมายเหตุ
ร้อยละการสั่งยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ	≥ 80	93.26	93.2			
ระดับความสำเร็จ PTC	ระดับ 3	3	3			
โรงพยาบาลตัดรายการยา 8 รายการ	≤ 1 รายการ	0	0			
จัดทำฉลากยามาตรฐานและฉลากยาเสริม 13 กลุ่มยา	ระดับ 3	4	4			
ระดับความสำเร็จด้าน Ethics	ระดับ 3	3	3			
ร้อยละของการใช้ยาปฏิชีวนะ ในผู้ป่วย URI	≤ 20%	12.50 (175/1400)	13.78 (357/2951)			
ร้อยละของการใช้ยาปฏิชีวนะ ในผู้ป่วย AD	≤ 20%	23.64 (26/110)	24.41 (72/295)			
ร้อยละของการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดฯ	≤ 40%	26.03 (38/146)	25.35 (73/288)			
ร้อยละของการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบกำหนด	≤ 10%	3.33 (1/30)	4.55 (2/44)			
ร้อยละ ผู้ป่วยความดันสูงทั่วไปที่ใช้ ACEI/ARB/ Renin inhibitor) 2 ชนิด ร่วมกันในการรักษาภาวะความดันเลือดสูง	0	0	0			
ร้อยละ ผู้ป่วยที่ใช้ Glibenclamide ในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 65 ปี หรือมี eGFR น้อยกว่า 60 มล./นาที/1.73 ตร.ม	≤ 5	0	0			
ร้อยละ ผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ยา Metformin เป็นยาชนิดเดียวหรือร่วมกับยาอื่น เพื่อควบคุมระดับน้ำตาล โดยไม่มีข้อห้ามใช้ (eGFR <30 มล./นาที/1.73 ตร.ม.)	≥ 80%	88.83 (334/376)	86.07 (377/438)			เอาตาม thaiRDU
ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้ยา กลุ่ม NSAIDs ซ้ำซ้อน	≤ 5%	0.11 (1/945)	0.07 (1/1373)			